

APILIFE-VAR : spécialité renfermant 7 g de Thymol par plaquette (2 plaquettes par sachet) + huile essentielle d'eucalyptus + menthol et du camphre sur une plaquette de vermiculite.

1. Diviser une des 2 plaquettes en 4 morceaux
2. Placer les dans les 4 coins au-dessus des têtes de cadre : ne pas les placer au centre ou trop près du couvain.
3. Fermer la ruche et laisser agir pendant 7 jours.
4. Répéter ce traitement jusqu'à 4 fois avec 3 autres plaquettes, en remplaçant les anciennes à chaque fois.
5. Période de traitement recommandée : après la récolte d'été (mi-août), sans les hausses, à 20-25°C.
6. Il n'est pas nécessaire de créer un espace entre le produit et le couvre-cadre.
7. En cas de forte infestation, ce traitement doit être associé à un autre traitement en période hors couvain (hiver ou début de printemps) avec une autre molécule active.
8. Traiter toutes les ruches simultanément et nourrir avant l'application du traitement.

NB : ne pas utiliser lors de températures inférieures à 15°C ou supérieures à 30°C.

Ne pas extraire les rayons de la chambre à couvain présents pendant le traitement.

Un surdosage peut causer des perturbations du comportement de la colonie (agitation, abandon).

Si les symptômes persistent, retirer la dose excédante.